

Conversación y Consentimiento Informado para Anestesia/Sedación

Nombre del Paciente: _____ Fecha: _____

Peso: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Diagnóstico: _____

Tratamiento: _____

Información para su Consideración

Durante el tratamiento dental, los pacientes pueden tener dificultad para entender el procedimiento y/o su manejo debido a aspectos psicológicos, discapacidad cognitiva, física o médica, o temor y ansiedad. Considerando la seguridad y comodidad del paciente, estos podrían beneficiarse mediante manejo de comportamiento a través de técnicas de comunicación o inmovilización. Adicionalmente, el dentista podría también identificar la necesidad de un medicamento de sedación o anestesia para la comodidad y manejo de comportamiento del paciente. La anestesia es un método de suministro de medicamento para reducir la ansiedad, la consciencia del paciente durante la cirugía o tratamiento o la eliminación de dolor asociado a la cirugía o tratamiento.

Los pacientes pueden requerir anestesia local, sedación consciente ligera a moderada, sedación profunda o anestesia general para su comodidad durante la realización de restauraciones o procedimientos quirúrgicos dentales. La profundidad de la anestesia, excepto para la anestesia local, tiene grados que comienzan en un nivel bajo llamado "ligero" y ajustado a niveles más ligeros o profundos dependiendo de la tolerancia del paciente para el procedimiento e incomodidad. Su dentista le recomendará y explicará qué tipo de anestesia puede ser apropiada para sus necesidades médicas/dentales individuales.

En el caso de un menor de edad (cualquier persona con menos de 18 años de edad), la administración y monitoreo de la anestesia general puede variar dependiendo del tipo de procedimiento, el tipo de practicante, la edad y salud del paciente y el lugar dónde sea administrada la anestesia. Los riesgos pueden variar con cada situación específica. Se le sugiere explorar las opciones disponibles para la anestesia de su hijo o hija para su tratamiento dental, y consultar con su dentista o pediatra cuando lo necesite.

Se requieren las iniciales del paciente

Opción 1: Anestesia Local

_____ Agentes anestésicos, (medicamentos) se inyectan en un área pequeña con la intención de adormecer el área para recibir tratamiento dental. También pueden inyectarse cerca de un nervio para bloquear el nervio y causar adormecimiento en un área de la boca mayor al lugar de la inyección.

_____ *Los riesgos incluyen pero no se limitan a:* Es normal que el adormecimiento tarde un tiempo para desaparecer luego del tratamiento, usualmente de dos a tres horas. Esto puede variar dependiendo del tipo de medicamento utilizado. Sin embargo, en algunos, es posible que tarde más tiempo, y en algunos casos el adormecimiento puede ser permanente si el nervio resulta lesionado. Puede ocurrir infección, inflamación, reacciones alérgicas, decoloración, dolor de cabeza, sensibilidad en el lugar de inyección, mareo, náuseas, vómitos y tendencia a morderse la mejilla, lengua o labios.

_____ *Beneficios potenciales:* El paciente permanece despierto y puede responder a las indicaciones y preguntas. El dolor es reducido o eliminado durante el tratamiento dental.

Opción 2: Sedación por Inhalación de Óxido Nitroso/Oxígeno

_____ La inhalación de óxido nitroso/oxígeno (N₂O) es una forma ligera de sedación consciente utilizada para calmar a un paciente ansioso. El paciente es observado mientras se administra N₂O y luego de completar el tratamiento hasta que el paciente se recupere totalmente de sus efectos.

_____ *Los riesgos incluyen pero no se limitan a:* Un efecto inicial podría ser desorientación y un adormecimiento y hormigueo temporal. Náuseas y vómitos pueden ocurrir raramente. Si el paciente no acepta utilizar la máscara para N₂O durante el tratamiento, no es posible usar óxido nitroso/oxígeno.

_____ *Beneficios potenciales:* El paciente permanece despierto y puede responder a las indicaciones y preguntas. El N₂O ayuda a manejar la aprensión, ansiedad o miedo.

Opción 3: Sedación Consciente

_____ La sedación consciente es un nivel mínimamente suprimido de consciencia, inducido por medicamentos de forma controlada, que permite al paciente respirar de forma independiente y responder continuamente de forma apropiada a la estimulación física y/o indicaciones verbales; como por ejemplo, "abre los ojos".

_____ Sigue requiriéndose anestesia local para adormecer el área de tratamiento. Ese tipo de anestesia puede administrarse oralmente (como bebida o píldora), ejecutada en un músculo, o mediante una aguja insertada en una vena.

_____ *Los riesgos incluyen pero no se limitan a:* Puede ocurrir infección, inflamación, decoloración, moretones, sensibilidad en el lugar y vena de inyección (flebitis), mareo, náuseas y vómitos. Son posibles aunque raras reacciones adversas al medicamento incluyendo reacciones alérgicas y potencialmente mortales. Las complicaciones pueden requerir hospitalización o incluso resultar en daño cerebral o la muerte. Los reflejos de todos los pacientes sufren retraso. Niños: Los pacientes pueden tener una respuesta inmediata a la sedación consciente oral similar a estar alterados antes de que el medicamento los calme. Adultos: Los pacientes no pueden manejar un carro ni operar maquinaria durante 24 horas después de completar el tratamiento, debido a que los efectos de la sedación permanecen en el sistema incluso después de que el paciente esté despierto y pueda moverse.

_____ *Beneficios potenciales:* El dolor es reducido o eliminado durante el tratamiento dental. El estrés y la ansiedad pueden reducirse en alto grado y es frecuente no recordar después el tratamiento.

Opción 4: Sedación Profunda

_____ La sedación profunda es un estado suprimido de consciencia, controlado e inducido por medicamentos, del cual el paciente no despierta fácilmente; lo que puede estar acompañado de pérdida parcial de los reflejos de protección, incluyendo la capacidad para respirar sin asistencia y/o responder a estimulación física e indicaciones verbales.

_____ Sigue requiriéndose anestesia local para adormecer el área de tratamiento. Este tipo de anestesia es con frecuencia llamado anestesia general ligera y es usualmente administrado en consultorios dentales.

_____ *Los riesgos incluyen pero no se limitan a:* Puede ocurrir infección, inflamación, decoloración, moretones y sensibilidad en el lugar de inyección (flebitis). Puede ocurrir mareo, náuseas y vómitos. Son posibles, aunque raras, reacciones adversas al medicamento incluyendo reacciones alérgicas y potencialmente mortales. Las complicaciones pueden requerir hospitalización o incluso resultar en daño cerebral o la

muerte. Un acompañante responsable debe traer la paciente al consultorio, llevar el paciente a su hogar, y permanecer con el paciente. Los pacientes no pueden manejar un carro ni operar maquinaria durante 24 horas debido a que los efectos de la sedación permanecen en el sistema incluso después de que el paciente esté despierto y pueda moverse.

_____ *Beneficios potenciales:* El dolor es reducido o eliminado durante el tratamiento dental. El estrés y la ansiedad pueden reducirse en alto grado y es frecuente no recordar después el tratamiento.

Opción 5: Anestesia General

_____ La Anestesia General es un estado de inconsciencia o falta de consciencia, controlado e inducido por medicamentos, acompañado de una pérdida parcial o completa de los reflejos de protección, incluyendo la capacidad para respirar sin asistencia y/o responder voluntariamente a estimulación física e indicaciones verbales.

_____ Este tipo de anestesia es usualmente administrado en un hospital o centro de cirugía. Se usa típicamente anestesia local.

_____ *Los riesgos incluyen pero no se limitan a:* Puede ocurrir infección, inflamación, decoloración, moretones y sensibilidad en el lugar de inyección (flebitis). Puede ocurrir mareo, náuseas y vómitos. Son posibles, aunque raras, reacciones adversas al medicamento incluyendo reacciones alérgicas y potencialmente mortales. Las complicaciones pueden requerir hospitalización o incluso resultar en daño cerebral o la muerte. Un acompañante responsable debe traer la paciente al consultorio, llevar el paciente a su hogar, y permanecer con el paciente. Los pacientes no pueden manejar un carro ni operar maquinaria durante 24 horas debido a que los efectos de la sedación permanecen en el sistema incluso después de que el paciente esté despierto y pueda moverse.

_____ *Beneficio potencial:* El dolor es eliminado y el paciente no tiene recuerdo del procedimiento quirúrgico.

Tratamientos Alternativos, No Limitados a lo Siguiende:

_____ Si un nivel particular de anestesia no alivia la ansiedad o el dolor del paciente, bajo juicio clínico del dentista, y si el paciente individual puede tolerarlo, otro nivel de anestesia puede ser necesario. No todo consultorio dental o dentista tiene el equipamiento o entrenamiento para administrar todos los tipos de anestesia. Puede ser necesario referir al paciente a otro centro o a otro dentista que tenga el equipamiento o credenciales apropiadas, o puede ser utilizado un anestesiólogo en el consultorio. Estos tipos de servicios pueden resultar en costos adicionales.

Para Todas las Mujeres Pacientes

_____ Debido a que los anestésicos y medicamentos pueden ser dañinos para el feto y pueden causar defectos de nacimiento o aborto espontáneo, toda mujer debe informar al administrador de la anestesia si podría estar o está embarazada. Los anestésicos y medicamentos pueden afectar el comportamiento de un bebé que esté siendo amamantado. En cualquiera de estas situaciones, la anestesia y el tratamiento pueden ser pospuestos.

Para Todos los Pacientes

_____ Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca del método de anestesia recomendado y creo que tengo suficiente información para dar mi consentimiento tal como se refleja abajo.

Marque las casillas a continuación que se aplican a usted:

Consentimiento

Me han informado verbalmente y de la información proporcionada en esta forma sobre los riesgos y beneficios del tratamiento propuesto.

Me han informado verbalmente y a partir de la información proporcionada en esta forma de los riesgos y beneficios materiales de un tratamiento alternativo y de elegir no tratar mi afección.

Certifico que he leído y entiendo la información anterior y que entendí las explicaciones mencionadas, que mis preguntas fueron respondidas y que se han completado los espacios en blanco que requieren inserciones o completes. Autorizo y ordeno a este dentista que haga Cualquier cosa que él / ella considere necesario y conveniente en las circunstancias.

Doy mi consentimiento para recibir el tratamiento mencionado anteriormente.

Si bien el tratamiento puede ser cubierto por mi seguro médico y / o dental, acepto cualquier responsabilidad financiera por este tratamiento y autorizo el tratamiento.

o

Negativa

Me niego a dar mi consentimiento para el (los) tratamiento (s) propuesto (s) como se describe anteriormente y entiendo las posibles consecuencias asociadas con este rechazo.

Firma del paciente o padre / tutor legal

Fecha

Firma del testigo

Fecha

Certifico que he discutido los riesgos, beneficios y consecuencias asociadas con el tratamiento, así como los riesgos y beneficios del tratamiento alternativo con _____ (nombre del paciente o del padre / madre / tutor legal). El paciente ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y creo que mi paciente entiende lo que se ha explicado y acepta voluntariamente el tratamiento que se describe en este documento.

Firma del dentista

Fecha